



Autoanticorpi anti-rabphilina-3A

Indicazioni

► Infundibulo-ipofisite linfocitaria, carcinoma coloretale.

vedi

► [Autoanticorpi in malattie dell'ipofisi](#)

Prevalenza

Tabella 1

Malattie		Autori
Carcinoma coloretale	72,6 %	Chen et al. 2011
Controlli sani	15,9 %	
Infundibulo-ipofisite linfocitaria	75,8 %	Iwama et al. 2015
Adenoipofisite linfocitaria	11,1 %	
Controlli (masse sellari)	0 %	

Metodi di ricerca

Western blot

Bibliografia

Chen JS, Kuo YB, Chou YP, Chan CC, Fan CW, Chen KT, Huang YS, Chan EC: Detection of autoantibodies against Rabphilin-3A-like protein as a potential biomarker in patient's sera of colorectal cancer. Clin Chim Acta (2011); 412(15-16): 1.417 - 1.422 (PMID: [21536019](#)).

Iwama S, Sugimura Y, Kiyota A, Kato T, Enomoto A, Suzuki H, Iwata N, Takeuchi S, Nakashima K, Takagi H, Izumida H, Ochiai H, Fujisawa H, Suga H, Arima H, Shimoyama Y, Takahashi M, Nishioka H, Ishikawa SE, Shimatsu A, Caturegli P, Oiso Y: Rabphilin-3A as a Targeted Autoantigen in Lymphocytic Infundibulo-neurohypophysitis. J Clin Endocrinol Metab (2015); 100(7): E946 - 954 (PMID: [25919460](#)).