



Autoanticorpi anti-proteine SR

Acronima SR (proteine ricche in sequenze repetitive degli aminoacidi serina [S] e arginina [R])

vedi ► [Autoanticorpi nella Sclerodermia](#)

Autoanticorpi

Malattie	campioni	n positivi	%
Lupo eritematoso sistemico (LES)	50	26	52,0
LES con sindrome da anticorpi antifosfolipidi	11	5	45,5
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi	3	1	33,3
Connettivite mista (MCTD)	3	1	33,3
Artrite reumatoide	25	4	16,0
Sclerosi sistemica	5	1	20,0

Bibliografia

Neugebauer KM, Merrill JT, Wener MH, Lahita RG, Roth MB: SR proteins are autoantigens in patients with systemic lupus erythematosus. Importance of phosphoepitopes. *Arthritis Rheum* (2000); 43(8): 1.768 - 1.778 (PMID: [10943867](#)).

Overzet K, Gensler TJ, Kim SJ, Geiger ME, van Venrooij WJ, Pollard KM, Anderson P, Utz PJ: Small nucleolar RNP scleroderma autoantigens associate with phosphorylated serine/arginine splicing factors during apoptosis. *Arthritis Rheum* (2000); 43(6): 1.327 - 1.336 (PMID: [10857791](#)).