



## ACR-Kriterien des Sjögren-Syndroms

► Europäische Klassifikationskriterien des **Sjögren-Syndroms (SS)**

Klassifikationskriterien	Bemerkungen
<b>1. Okuläre Symptom</b>	Eine positive Antwort auf mindestens eine der folgenden Fragen: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Hatten Sie dauernd während mehr als 3 Monaten Probleme mit trockenen Augen?</li> <li>► Haben Sie ein wiederkehrendes Fremdkörpergefühl von <b>Gries oder Sand in den Augen?</b></li> <li>► Benutzen Sie künstliche Tränen mehr als dreimal pro Tag?</li> </ul>
<b>2. Orale Symptome</b>	Eine positive Antwort auf mindestens eine der folgenden drei Fragen: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Haben Sie seit mehr als 3 Monaten einen <b>trockenen Mund?</b></li> <li>► Hatten Sie als Erwachsener immer wieder oder dauernd <b>geschwollene Speicheldrüsen?</b></li> <li>► Trinken Sie häufig Flüssigkeit, um trockene Speisen hinunterzuschlucken?</li> </ul>
<b>3. Okuläre Befunde</b>	Objektiver Nachweis einer Augenbeteiligung auf der Basis eines positiven Ergebnisses bei mindestens einem der folgenden zwei Tests: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Schirmer-I-Test (<math>\leq 5</math> mm in 5 Minuten)</li> <li>► Rose-Bengal-Wert (<math>\geq 4</math> nach dem van Bijsterveld-Score-System)</li> </ul> <p>(Workshop on Diagnostic Criteria for Sjögrens Syndrom, Clin Exp Rheumatol (1989); 7: 212 - 219)</p>
<b>4. Histopathologie</b>	Lippenbiopsie: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Focus-Score <math>\geq 1</math> in der Biopsie der kleinen Speicheldrüsen.</li> </ul> <p>Ein Focus ist definiert als eine Ansammlung von mindestens 50 mononukleären Zellen. Der Focus-Score ist definiert als die Zahl der Foci pro 4 mm<sup>2</sup> Speicheldrüsengewebe.</p>
<b>5. Speicheldrüsenbeteiligung</b>	Objektiver Nachweis einer Beteiligung der Speicheldrüsen, festgestellt auf der Basis eines positiven Ergebnisses in mindestens einem der folgenden drei Tests: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Szintigramm der Speicheldrüsen.</li> <li>► Sialographie der Speicheldrüsen.</li> <li>► Unstimulierter Speichelfluß (<math>\leq 1,5</math> ml in 15 Minuten).</li> </ul> <p>(Workshop on Diagnostic Criteria for Sjögrens Syndrom, Clin Exp Rheumatol (1989); 7: 212 - 219)</p>
<b>6. Autoantikörper</b>	Vorhandensein von mindestens einem der folgenden Serum-Autoantikörper: <ul style="list-style-type: none"> <li>► <u>SS-A/Ro-Autoantikörper</u></li> <li>► <u>SS-B/La-Autoantikörper</u></li> <li>► <u>Zellkern-Autoantikörper</u></li> <li>► Rheumafaktor</li> </ul> <p>(Workshop on Diagnostic Criteria for Sjögrens Syndrom, Clin Exp Rheumatol (1989); 7: 212 - 219)</p>



## ACR-Kriterien des Sjögren-Syndroms

### 7. Ausschlußkriterien

- ▶ Vorbestehendes Lymphom
- ▶ Erworbene Immunschwäche
- ▶ Sarkoidose
- ▶ Graft-versus-Host-Krankheit

(Fox JF et al.: Arthritis and Rheumatism (1986); 29: 577 - 585)