



Ursachen des Raynaud-Phänomen

Primäres Raynaud-Phänomen																	
Morbus Raynaud	<p>Mit einer Häufigkeit von 4 - 5 % als primäres Raynaud-Phänomen bei jungen Frauen (< 25 Jahre). Häufiger in kalten Klimazonen.</p> <p>Auftreten ohne erkennbare bekannte Ursache vor allem bei jungen Frauen. Falls bis zu zwei Jahren nach Beginn der Symptomatik kein Hinweis auf eine Autoimmunerkrankung auftritt, handelt es sich wahrscheinlich um ein primäres Raynaud-Phänomen.</p> <p>Keine Gefahr der ischämischen Gewebeschädigung.</p> <p>Anomale Befunde bei der Nagelfalz-Kapillarmikroskopie und hochtitrige Autoantikörper deuten auf ein sekundäres Raynaud-Phänomen hin.</p>																
Sekundäres Raynaud-Phänomen																	
Kollagenosen	<table border="0"> <tr> <td>Sklerodermie, systemische</td> <td>> 95 %</td> </tr> <tr> <td>Polymyositis / Dermatomyositis</td> <td>20 - 40 %</td> </tr> <tr> <td>Sjögren Syndrom</td> <td>20 - 50 %</td> </tr> <tr> <td>Lupus erythematodes, systemischer</td> <td>20 - 30 %</td> </tr> <tr> <td>Arthritis, rheumatoide</td> <td>< 5 %</td> </tr> <tr> <td>Vaskulitis, systemische</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kollagenose, undifferenzierte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mischkollagenose</td> <td></td> </tr> </table>	Sklerodermie, systemische	> 95 %	Polymyositis / Dermatomyositis	20 - 40 %	Sjögren Syndrom	20 - 50 %	Lupus erythematodes, systemischer	20 - 30 %	Arthritis, rheumatoide	< 5 %	Vaskulitis, systemische		Kollagenose, undifferenzierte		Mischkollagenose	
Sklerodermie, systemische	> 95 %																
Polymyositis / Dermatomyositis	20 - 40 %																
Sjögren Syndrom	20 - 50 %																
Lupus erythematodes, systemischer	20 - 30 %																
Arthritis, rheumatoide	< 5 %																
Vaskulitis, systemische																	
Kollagenose, undifferenzierte																	
Mischkollagenose																	
Medikamente, Toxine	<p>Amphetamine Clonidin Ergotamin Vinblastin Bleomycin Vinylchlorid</p>																
Aterielle Läsionen	<p>Arterielle Thromben Atherosklerose Schultergürtelkompressionssyndrom Thrombangiitis obliterans (Morbus Buerger)</p>																
Berufskrankheiten	<p>Hand-Arm-Vibrationssyndrom Hypothenar-Hammer-Syndrom</p>																
Hämatologische Erkrankungen	<p>Kälteagglutinine Kryoglobuline Gammopathie-Diagnostik</p>																
Sonstige	<p>Hypothyreoidismus Karzinome Perniones Reflex sympathetic dystrophy</p>																